RÉVEIL AGRICOLE

Cultivateurs, soyez prévoyants

En raison des difficultés chaque jour plus grandes des transports, vous ne pourrez pas, l'année prochaine, changer de semences de pommes de terre comme vous en avez pris l'habitude avant guerre.

Vous devez donc produire votre propre semence destinée à la plantation de 1942.

UNE SEULE METHODE. — La sélection des touffes de pommes de terre pendant leur végétation. Pour obtenir un plant sain, vous devez apprendre à bien connaître les **maladies de dégénérescence.**

Vos pommes de terre vous semblent-elles malades ? Consultez ce qui suit, vous connaîtrez la maladie.

FEUILLES. — 1° De la base de la tige, l'enroulement des feuilles, qui prennent alors une apparence cornée ; **(Enroulement).**

2° Au sommet des tiges, les plus ou moins entrelacées, elles ne sont jamais cassantes ; elles, les tubercules sont généralement malades ; **(Rhizoctone).**

3° Feuilles rondes gaufrées ; insecte chasseur du choux de Milan **(Frisolée).**

4° Prédilection des marguerites pâles plus ou moins apparentes ; à observer à l'ombre ou par temps couvert. **(Mosaïque).**

5° Taches jaune vif irrégulières, nombreuses semblables aux taches des feuilles de tabac appelée Au **(Panachure).**

6° Petites taches noires irrégulières suivant les nervures, visibles surtout à la face inférieure de la feuille dont le pétiole est fragile, flasque, la tige tombe facilement **(Bigarrure).**

Remede pour ces maladies.

Enlèvement, à la bêche, du mosaïque, la panachure, la bigarrure, ont des maladies de dégénérescence ; les touffes malades, ou suspectes doivent être arrachées dès l'éveil des apparitions, ainsi que les pieds voisins.

Taches brunes, surtout cerclées de noir, très apparent se trouvant au sommet de la touffe, parfois même d'un seul côté de la plante. **(Verticiliose ou maladie du cercle).** **Remede :** Maladie des vieux sols et chaudes, à distinguer de la maladie du mildiou. Ne pas utiliser pour la semence les tubercules provenant des touffes atteintes par la jaune.

Larges taches brunes, bordées à la face inférieure de feuilles par un cercle de duvet blanchâtre ; **(Mildiou).** — **Remede :** Maladie des vieux sols chaudes, à distinguer de la maladie du mildiou. Ne pas utiliser pour la semence les tubercules provenant des touffes atteintes par la jaune.

Taches brunes, bordées à la face inférieure de feuilles par un cercle de duvet blanchâtre ; **(Mildiou).** — **Remede :** Maladie des vieux sols chaudes, à distinguer de la maladie du mildiou. Ne pas utiliser pour la semence les tubercules provenant des touffes atteintes par la jaune.

Larges taches brunes, bordées à la face inférieure de feuilles par un cercle de duvet blanchâtre ; **(Mildiou).** — **Remede :** Maladie des vieux sols chaudes, à distinguer de la maladie du mildiou. Ne pas utiliser pour la semence les tubercules provenant des touffes atteintes par la jaune.

Taches brunes, bordées à la face inférieure de feuilles par un cercle de duvet blanchâtre ; **(Mildiou).** — **Remede :** Maladie des vieux sols chaudes, à distinguer de la maladie du mildiou. Ne pas utiliser pour la semence les tubercules provenant des touffes atteintes par la jaune.

Larges